© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

No. 1 u. 2. Rec'd Mar 7/96 Januar-Februar 1896.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Achtundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6. — für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von *R. Friedländer & Sohn in Berlin* zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum ex insulis Philippinis

auctoribus

J. F. Quadras et O. F. von Moellendorff.

Ennea (Diaphora) cristatella Mlldf.

T. perforata, subcylindrica, tenuiscula, pellucida, albohyalina, confertim costulata, sericina; spira sensim attenuata, apice obtuso. Anfr. $9^1/_2$ convexiusculi, ad suturam sat impressam angulati, ultimus paullum distortus, antice paullum ascendens, basi compressus, crista sat distincta cinctus. Apertura verticalis, rotundato-tetragona, peristoma modice expansum, intus valde labiatum. Lamella parietalis valde elevata, longe intrans, columellaris remota, valida, dentibus 2 in formam crucis oppositis. Sinulus recedens subcircularis.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Diam. 1,6, alt. 5,75 mm.

Hab. ad vicum Odiongan insulae Tablas leg. coll. indigena.

Ennea (Diaphora) strophostoma Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, subcylindrica, pellucida, hyalina, laevis, nitens; spira sensim attenuata apice obliquo, obtuso. Anfr. 8 fere plani, ad suturam sat impressam crenulati, ultimus breviter solutus, valde deflexus, lateraliter valde compressus, superne et inferne crenato-cristatus. Apertura subverticalis, arcta, elongate-piriformis, peristoma parum expansum, reflexiusculum. Lamella parietalis valida, valde elevata, columellaris sat valida profunda, dente longiusculo in palato opposito.

Diam. 1,25, alt. 5 mm.

Hab. prope vicum Magapig provinciae Cagayan.

Ennea (Diaphora) solenidium Mlldff.

T. anguste sed pervie perforata, subcylindrica, tenuis, pellucida, hyalino-alba, levissime striatula, nitens; spira cylindracea, superne vix attenuata, apice eroso aperta. Anfr. qui supersunt 8 convexiusculi, lente accrescentes, ultimus a quarta parte solutus, porrectus, subdeflexus, distinctius striatus, basi compressus, obtuse cristatus. Apertura fere verticalis, oblique piriformis, peristoma modice expansum, vix labiatum. Lamellae nullae.

Diam. 2,5—2,75, alt. 7—8 mm.

Ennea cumingiana Hidalgo J. de Conch. 1887 p. 41 (non Pfeiffer).

Hab. in insula Tablas leg. cl. J. Quadras et coll. indigena.

Ennea (Diaphora) telescopium Mlldff.

T. cylindrice et pervie umbilicata, fere exacte cylindrica, tenuis, pellucida, hyalino-alba, oblique costulata, sericina; spira cylindracea, sursum vix attenuata, apice decollata, aperta. Anfr. qui supersunt 13 planulati, lentissime accres-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

centes, ultimus a tertia parte solutus, porrectus et deflexus, basi subcompressus, obtuse cristatus. Apertura verticalis, obliquepiriformis,peristomalatiuscule expansum,albolabiatum. Lamellae nullae.

Diam. 3—3,25, alt. 11—11,5 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Vitrinoconus omphalotropis Mlldff.

T. modice sed pervie et subcylindrice umbilicata, umbilico $^2/_9$ diametri adaequante, sat elate trochiformis, tenuis, subpellucida, confertim arcuatim costulata, sericina, corneoconoidea apice obtuso. Anfr. $9^1/_2$ convexiusculi, sutura per carinam exsertam distincte marginata subcanaliculata disjuncti, lentissime accrescentes, ultimus carina acuta exserta carinatus, basi planiusculus, fere laevigatus, nitens, circa umbilicum carinula filiformi cinctus. Apertura parum obliqua, trapezoidea, peristoma rectum, obtusum.

Diam. maj. 9, min. 8, 6, alt. 6 mm.

Hab. prope vicum Libmanan provinciae Camarines insulae Luzon leg. coll. indigena.

Vitrinoconus arctissimus Q. et Mlldff.

T. latissime umbilicata, umbilico late infundibuliformi $^1/_2$ diametri superante, conoideo-depressa, sublentiformis, superne dense plicato-striata, nitidula, brunneo-cornea; spira parum elevata, lateribus subconvexiusculis. Anfr. 9 lentissime accrescentes, convexiusculi, sutura per carinam exsertam filomarginata discreti, ultimus carina peracuta, utrimque bene exserta carinatus, basi paullo convexior, laevigatus, circa umbilicum angulatus, tum declivis. Apertura valde obliqua, securiformis, peristoma superne rectum, obtusum, medio protractum, basi et ad umbilicum subexpansum, incrassatulum.

Diam. maj. 11, min. 10,5, alt. 4,5 mm.

Hab. ad vicum San Josè districtus Principe insulae Luzon.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Helicarion mollis Mlldff.

T. depressa, tenuissima, sat distincte plicato-striatula, nitida, pellucida, virescens; spira plana. Anfr. 3½ rapide accrescentes, sutura appressa, distincte marginata disjuncti, ultimus valde dilatatus, subtus membranaceus.

Diam. maj. 18, min. 12.5, alt. 8 mm.

Animal unicolor, pallens, pes valde compressus, altus, superne acute carinatus, supra glandem caudalem bene arcuatus, cornu breve vix prominulum efficiens; chlamydis loba sinistra papillis 2, dextra 1 munita.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Obs. Similis *H. resilienti* Beck ex insula Cebu, sed testa majore, sutura, sculptura magis distincta, anfractu ultimo magis dilatato, animali unicolore devians.

Euplecta (Coneuplecta) pacifica Q. et Mlldff.

T. rimata, turbinata, tenuis, pellucida, superne levissime plicato-striatula, nitens, luteo-cornea; spira valde elevata, fere exacte conica. Anfr. 6⅛ lente accrescentes, modice convexi, ultimus ad peripheriam indistincte angulatus, basi pallidior, fere glabratus. Apertura sat excisa, peristoma simplex, acutum, margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. maj. 6, alt. 5,75.

Hab. prope vicum Casiguran districtus Principe insulae Luzon.

Kaliella opaca Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, elate trochoidea, confertim et tenuiter striatula, subopaca, fulvo-brunnea, sursum pallescens; spira valde elevata, lateribus convexiusculis, Anfr. 6½ convexiusculi, sutura filiformi disjuncti, ultimus carina acuta exserta carinatus, basi lineis spiralibus microscopicis cinctus, nitidulus. Apert. fere verticalis, late elliptica, modice exisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari subcalloso, superne breviter reflexo,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Diam. 4.25, alt. 4,5 mm.

Hab, Circa vicum Palanan provinciae Isabela de Luzon.

Kaliella chondrium Q. et Mlldff.

T. vix rimata, globosa, tenuis, subpellucida, undique confertim costulata, sericina, brunnea; spira convexo-conoidea. Anfr. 5¼ convexi, pone suturam subangulati, lente accrescentes, sutura profunde impressa, filomarginata disjuncti, ultimus ad peripheriam linea elevata tenui cinctus. Apert. verticalis, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari paullum dilatato, reflexo.

Diam. maj. 1.9, alt. 1.6 mm

Hab. ad vicum Palanan provinciae Isabela de Luzon.

Lamprocystis leucochondrium Mlldff.

T. vix rimata, depresse globosa, tenuis, pellucida, hyalina, subtiliter striatula, valde nitens; spira sat elevata lateribus convexiusculis. Anfr. 5½ planiusculi, lente accrescentes, sutura submarginata disjuncti, ultimus lateraliter subcompressus, basi bene convexus. Apertura fere verticalis, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum obtusum, margine basali et columellari callosis, columellari superne reflexiusculo.

Diam. 2,8, alt. 2 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Hemitrichia platyzona Q. et Mlldff.

T. subconvexo-depressa, solidula, flavescens, ad peripheriam zona lata castanea plus minusve diluta cincta; spira parum elevata apice obtuso. Anfr. 6 sat convexi, lente accrescentes, sutura sat impressa disjuncti, lineis spiralibus et radialibus confertis minute granulati — granulis fere 60 in 1 □ mm. —, pilis brevibus flavidis velutini, ultimus lateraliter applanatus, basi laevigatus, nitens. Apertura modice obliqua, compresse elliptica, valde excisa, peristoma simplex, acutum, basi et ad columellam albo-callosum, columella superne reflexiuscula.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Diam. maj. 25, alt. 14,5 apert. lat. 14, long. 10 alt. 9 mm.
„ „ 24. „ 15 „ „ 14.5 „ 10 „ 9 mm.
Hab. in insula Tablas primus leg. J. Quadras.

Hemitrichia setosula Mlldff.

T. convexo-depressa, solidula, castanea, zona suturali flavescente ornata; spira modice convexa, superne plana, apice haud aut vix prominulo. Anfractus 5½ convexi, sutura modice impressa disjuncti, punctis impressis seriatim dispositis — 25 in 4 □ mm. — sculpti, in punctis setis rigidis longiusculis aureis hirsuti, ultimus ad peripheriam vix angulatus, haud applanatus, basi medio flavescens. Apertura modice obliqua elliptica, valde excisa, peristoma rectum, acutum, basi et ad columellam albo callosum, superne reflexiusculum.

Diam. maj. 22, alt. 13, apert. lat. 12, long. 9,5, alt. 8,5 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Hemiglypta franciscanorum Q. et Mlldff.

T. omnino aut fere obtecte perforata, valde depressa, solida, superne per lineas spirales profunde impressas et strias transversas minute sed valde distincte et subregulariter granulata — granulis ca. 100 in 4 □ mm. —, superne subolivaceo-castanea; spira breviter conoidea, apice plano. Anfr. 6 fere plani, lente accrescentes, sutura vix impressa discreti, ultimus acutissime carinatus, supra carinam distincte impressus, basi striatulus, valde nitens, ad carinam taenia angusta fusca, tum zona lata fulvo-brunnea cinctus, circa columellam virescenti-flavidus. Apertura modice obliqua, lanceolata, sat excisa, peristoma rectum, obtusum, intus calloso-incrassatum, ad perforationem superne breviter dilatatum.

Diam. maj. 51, min. 46, alt. 22, apert. lat. 29, long. 16 alt. 13,5 mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hab. ad vicum Baao provinciae Camarines leg. R. P. Ord. Franc., ad vicum Libmanan ejusdem provinciae coll. indigena.

Inozonites stenomphalus Q. et Mlldff.

T. anguste perforata, depresse-conoidea, superne confertim costulata, nitidula, corneo-flavescens; spira pro genere sat elevata apice obtuso. Anfr. 5'₂ convexiusculi, sutura profunde impressa, per carinam exsertam distincte marginata, fere canaliculata disjuncti, lentissime accrescentes, ultimus supra peripheriam carina filiformi cinctus, infra carinam glabratus, bene convexus, nitens. Apertura fere verticalis, late elliptica, valde excisa, peristoma rectum, obtusum, margine columellari parllum sinuato.

Diam. maj. 6, min. 5.5, alt. 3.5 mm.

Hab. prope vicum Palanan provinciae Isabela de Luzon.

Satsuma palananica Q. et Mlldff.

T. anguste sed aperte et subcylindrice umbilicata, depresso-conoidea, tenuiscula, subpellucida, curvatim plicato-striatula, corneo-brunnea; spira sat elevata, lateribus vix convexiusculis, apice obtuso. Anfr. 5'₂ convexiusculi, lente accrescentes, ultimus ad peripheriam subacute angulatus. Apertura valde obliqua, cordiformis, peristoma superne vix, extus et basi magis expansum, intus albolabiatum.

Diam. maj. 7.75, min. 7, alt. 4.75 mm.

Hab. prope vicum Palanan provinciae Isabela de Luzon.

Obs. Proxima Helici gouldi Pfr. et cum illa haud generi Trochomorphae, sed potius Satsumae inserenda.

Satsuma apex Q. et Mlldff.

T. anguste et fere obtecte umbilicata, trochiformis, tenuiscula, pellucida, oblique striatula, lineis spiralibus sat distinctis et plicis rugulosis subtilibus oblique antrorsum decurrentibus sculpta, nitens, pallide flavescens; spira valde

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

elevata lateribus sat concavis, apice obtusulo, glabrato, fusco. Anfr. 6½ plani, sutura per carinam subexsertam filomarginata disjuncti, ultimus carina subacuta, utrimque bene exserta carinatus, antice breviter sed valde deflexus, basi paullum convexus. Apertura maxime obliqua, lanceolata, peristoma superne vix, extus et basi magis expansum, basi reflexiusculum, margine columellari superne valde dilatato, umbilicum fere obtegente.

Diam. 18, alt. 14,5 mm.

var. apiculata Mlldff.:

Minor, paullo altior, anfr. 6, ultimus basi paullo magis convexus. Diam. 16, alt. 13,25 mm.

Hab. in insulis Calamianes leg. coll. indigena.

Plectotropis quadrasi Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, subconoideo-depressa, acute carinata, tenuis, subpellucida, transverse leviter plicato-striata, lineis spiralibus maxime confertis minutissime granulosa, fulvo-cornea: spira breviter elevata, lateribus fere strictis. Anfr. 5½ fere plani, sat lente accrescentes, sutura per carinam subexsertam marginata disjuncti, ultimus ad carinam bene exsertam subduplicatam setis brevibus indutus, basi convexior, ad umbilicum declivis. Apertura sat obliqua, rotundato-securiformis, peristoma? (def.).

Diam. maj. 18, min. 16, alt. 8 mm.

Hab in cacumine montis inter oppidum Hagan et vicum Palanan provinciae Isabela de Luzon.

Aulacospira rhombostoma Mlldff.

T. modice, sed aperte umbilicata, conoideo-depressa, tenuis, subtiliter striatula, opaca, corneo-lutea; spira modice elevata, subgradata, apice obliquo, submucronato. Anfr. 4 fere plani, obtuse angulati, ultimus superne pone angulum leviter sulcatus, antice breviter descendens, brevissime solutus. Apertura valde obliqua, rotundato-rhombea, peristoma

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

continuum, tenue, undique leviter expansum. Lamella parietalis valida, valde elevata, dentibus 3 in columella, basi et margine externo in formam crucis oppositis.

Diam. 3,25, alt. 1,5 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Chloraea quadrasi Mlldff.

T. globoso-depressa, solidula, levissime plicato-striatula, lineis spiralibus microscopicis decussatula, opaca, sursum nitidula, caeruleo-smaragdina; spira semiglobosa, apice plano. Anfr. 4 convexiusculi, ultimus tumidulus, ad peripheriam acute angulatus angulo aperturam versus evanescente, basi inflatus, subgibber, pone aperturam suberistatus, tum coarctatus et brevissime sed valde deflexus, in parte deflexa laete flavus. Apertura diagonalis, truncato-elliptica, peristoma modice expansum, reflexiusculum, superne et usque ad medium basin laete flavum, tum album. Columella oblique curvatim descendens, medio distincte dentata, superne interdum macula castanea induta.

Diam. maj. 20, alt. 12, apert. lat. 12, long. 10, alt. 6,5 mm.

Hab. ad vicum Magapig provinciae Cagayan insulae Luzon.

Cochlostyla (Callicochlias) chionodes Mlldff.

T. depresse globosa, solida sed subpellucida, leviter striatula, lineis spiralibus confertis microscopicis decussata, pallide virescenti-flavida, rarius brunnescens, cuticula hydrophana nivea aut omnino obducta aut taeniatim ornata; spira subsemiglobosa apice purpureo. Anfr. $4^1/_2$ convexi, ultimus bene rotundatus, antice parum dilatatus, circa columellam castaneo-zonatus. Apertura sat obliqua, fere circularis, valde excisa, peristoma modice expansum, reflexiusculum, extus fusco-marginatum, margo externus medio sat protractus. Columella oblique substricte descendens, valde dilatata, superne sat excavata.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hab. in insula Cobrador prope Romblon leg. coll. indigena.

Obs. species quasi intermedia inter. C. valenciennesi et coccomelon.

Cochlostyla (Axina) garibaldiana Dohrn et Semper.
var. holoserica Mlldff.

Differt a typo anfractu ultimo multo magis deflexo, testa cuticula sericina, callo parietali crassiore.

Diam. maj. 75, min. 65, alt. 33, apert. lat. 48, long. 31, alt. 22 mm.

Hab. prope vicum San José districtus Principe insulae Luzon.

Cochlostyla (Orustia) melanorhaphe Q. et Mlldff.

T. conoideo-globosa, solidula, levissime striatula, opaca, olivacea, sursum pallescens, taeniis cuticulae hydrophanae albidis 2, ad suturam et ad peripheriam ornata; spira sat elevata, apice plano. Anfr. 5 convexiusculi, sutura appressa nigromarginata disjuncti, ultimus bene convexus, antice sat descendens, circa columellam taenia angusta atrofusca circumdatus. Apert. fere diagonalis, ovalis, sat excisa, peristoma latiuscule expansum, reflexiusculum, albolabiatum, nigromarginatum. Columella sat excavata, sat lata, oblique substricte descendens.

Diam. maj. 28, alt. 26,5 mm.

Hab. ad flumen Digollorin provinciae Isabela insulae Luzon.

Cochlostyla (Helicostyla) gilberti Q. et Mlldff.

T. globosa, solida, leviter striata, lineis spiralibus impressis, sat et irregulariter distantibus sculpta, leviter oblique malleata, olivacea, sursum pallescens, taeniis cuticulae hydrophanae numerosis laceratis picta; spira semiglobosa apice fere plano. Anfr. 5 convexi, sutura subappressa marginata disjuncti, ultimus tumidus, antice longe paullatim descendens.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Apertura valde obliqua, ovalis, sat excisa, peristoma late expansum, reflexiusculum, albolabiatum, extus rubello-marginatum. Columella valde excavata, oblique stricte descendens.

Diam. maj. 51,5, alt. 46, apert. lat. 32, long. 35, alt. 27 mm.

Hab. prope oppidum Baler districtus Principe insulae Luzon.

Cochlostyla (Helicobulimus) intermedia Q. et Mlldff.

T. oblongo-ovata, solida, tenuiter plicato-striatula, fusca, sursum castanea, cuticula hydrophana tenuissima subunicolore olivaceo-brunnea obducta, opaca; spira valde elevata, sensim attenuata, apice obtuso. Anfr. 6—6½ sat convexi, sutura profundiuscule impressa disjuncti, lente accrescentes, ultimus $^5/_{11}$ altitudinis aequans. Apertura valde obliqua, ovalis, parum excisa, peristoma parum expansum, intus late nigrolimbatum. Columella parum torta, substricta, fere recta, cum margine basali angulum parum distinctum formans.

Diam. 42, alt. 65 mm

Hab. prope vicum San José districtus Principe insulae Luzon.

var. *subcylindrica* Mlldff.

T. ovato-elongata, anfr. 6½—7, lentius accrescentes, ultimus $^2/_5$ altitudinis aequans, apertura minor, columella paullo magis torta. Diam. 40, alt. 65 mm.

Hab. prope oppidum Baler.

Hypselostoma sibuyanicum Mlldff.

T. rimata, tenuis, irregulariter turrito-conica, subtilissime striatula, opaca, pallide corneo-brunnea; spira turrito-conica apice obliquo, nitidula. Anfr. 5 convexi, sutura valde impressa disjuncti, ultimus subplanus, infra medium obtuse carinatus, supra carinam leviter sulcatus, antice valde ascendens, brevissime solutus et porrectus. Apertura retrorsum

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

inclinata, rotundato-rhomboidea, peristoma simplex, tenue, valde expansum. Lamella parietalis valida, valde elevata, dentibus 3 longiusculis, subaequalibus in formam crucis oppositis.

Diam. 2,3, alt. 2 mm.

Hab. in monte altiore insulae Sibuyan leg. C. Roebelen.

Hypselostoma polyodon Mlldff.

T. anguste perforata, turbinata, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, opaca, luteocornea; spira sat elevata lateribus subconcavis, apice obliquo, obtuso. Anfr. 5 convexi, sutura profunde impressa fere canaliculata disjuncti, ultimus ad peripheriam obtuse carinatus, supra carinam impressus, subsulcatus, basi planus, antice breviter solutus, porrectus, sat ascendens, carina initio partis ascendentis subito evanescente. Apertura valde retrorsum inclinata, rotundato-rhomboidea, peristoma tenue, undique breviter expansum. Lamella parietalis validissima, fere $^2/_3$ altitudinis aperturae aequans, flexuosa, margine dextro lamella illi approximata longiuscula opposita, columellaris brevis sat valida, dentes basales 3 validiusculi.

Diam. 2,66, alt. 2 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Prosopeas romblonicum Mlldff.

T. imperforata, subcylindraceo-turrita, tennis, pellucida, subtiliter curvatim striatula, sat nitens, straminea; spira sensim attenuata apice semigloboso. Anfr. 7 planulati, ultimus infra peripheriam confuse subangulatus. Apertura modice obliqua, anguste acuminato-ovalis, peristoma simplex, acutum, margo dexter supra medium protractus, columella vix torta, calloso-incrassata.

Diam. 4,6, alt. 15.

Hab. in insula Romblon leg. coll. indigena.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cyclotus (Platychaphe) lateplicatus Mlldff.

T. latissime umbilicata, discina, solidula, transverse sat distanter plicato-striata, lineis spiralibus subtilibus valde confertis decussata, luteo-cornea; spira plana apice mucronato, brevissime prominulo. Anfr. $4^1/_2$ teretes, sutura perprofunda pliculosa disjuncti, ultimus antice sat descendens. Apertura modice obliqua, circularis, peristoma rectum, obtusum. Operculum terminale, extus valde concavum, anfr. 6 gradati, oblique ruditer plicati.

Diam. maj. 14, alt. 6,5, apert. diam. 5 mm.

var. stenostoma Mlldff. Minor, apertura minore, anfr. ultimo plerumque magis descendente, spira paullo magis prominula.

Cyclotus latecostatus Hidalgo J. de Conch. 1888 p. 58 (ex parte, non Kobelt).

Hab. in insula Tablas primus leg. J. Quadras.

Arinia orulum Mlldff.

T. rimata, ovata, tenuis, pellucida, pallide-flavescens, sursum aurea; spira ventricosulo-subcylindracea, sursum conoidea, apice obliquo, glabrato. Anfr. 5 turgidi, primi 3 valde distanter costulati, costulis 25 in anfractu tertio, penultimus usque ad tertiam partem costulis paullatim evanescentibus sculptus, tum laevigatus, ultimus laevis, in quarta parte ab initio leviter constrictus, tum tumidulus. Apertura fere verticalis, circularis, peristoma valde distincte duplex, externum modice expansum, internum sat expansum, breviter porrectum, sulco ab illo separatum.

Diam. 2,4, alt. 3,5 mm.

Hab. in monte altiore insulae Sibuyan leg. C. Roebelen.

Palaina chalarostoma Mlldff.

T. sinistrorsa, anguste umbilicata, irregulariter ovato-conica, costulis tenuibus acutis, foliaceis, valde distantibus

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

sculpta, tenuis, pellucida, alba. Anfr. 6 convexi, primi 4 spiram late conoideam apice obliquo glabrato formantes, penultimus paullum distortus, ultimus initio constrictus, a media parte solutus, deflexus et porrectus, circa umbilicum valde compressus, subcristatus. Apertura vix obliqua, circularis, peristoma simplex, undique modice expansum.

Diam. 1,5, alt. 2,8 mm.

Hab. prope vicum Atimonan provinciae Tayabas insulae Luzon leg. coll. indigena.

Diplommatina (Sinica) balerica Q. et Mlldff.

T. vix rimata, acuminato-oblonga, costulis filiformibus sat distantibus subflexuosis sculpta, fulvo-cornea; spira sat elongata, fere regulariter conica. Anfr. 7½ convexi, ultimus initio modice constrictus, parum distortus, antice paullum ascendens. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum sat late expansum, internum subporrectum, superne callo lato appressum. Lamella columellaris validiuscula, subhorizontalis, spiraliter recendens, palatalis brevis, supra columellam conspicua.

Alt. 2,5, diam. 1,25 mm.

Hab. prope oppidum Baler districtus Principe insulae Luzon.

Omphalotropis filocincta Q. et Mlldff.

T. angustissime perforata, ovato-conica, tenuis, pellucida, vix striatula, sericina, luteo-fulva; spira fere regulariter conica apice obtusulo. Anfr. 6 modice convexi, sutura valde impressa disjuncti, ultimus tumidulus, ad perforationem declivis, carina filiformi cinctus. Apertura parum obliqua, acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, columella profunde sinuata, carinulam in perforationem emittens.

Diam. 2,4, alt. 3,2 mm.

Hab. circa vicum Palanan et ad flumen Digollorin provinciae Isabela de Luzon.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Helicina (Ceratopoma) quadrasi Mlldff.

T. conoideo-subglobosa, tenuis, subpellucida, oblique striatula, lineis spiralibus sub lente fortiore vix conspicuis decussatula, flava: spira convexo-conoidea, apice acutulo. Anfr. $4^1/_2$ planulati, ultimus convexior, ad peripheriam carina obtusa, sed bene exserta cinctus, pone aperturam rufulus. Apertura modice obliqua, rotundato-triangularis, peristoma modice expansum, sublabiatum, intus rubello-marginatum; columella brevis, subexcavata, cum margine basali angulum parum distinctum formans. Operculum tenue, corneum.

Diam. maj. 6, alt. 4,5 mm.

Hab. prope vicum Casiguran districtus Principe insulae Luzon.

Helicina (Pleuropoma) sphaeridium Mlldff.

T. conoideo-globosa, solidula, leviter striatula, lineis spiralibus elevatis decidnis distantibus cincta, opaca, pallide lutescens, sursum fulvescens aut rubella; spira convexo-conoidea. Anfr. $4^1/_2$ planulati, ultimus convexior, ad peripheriam perindistincte subangulatus. Apertura parum obliqua, rotundato-triangularis, peristoma brevissime expansum, vix labiatum.

Diam. 4,2, alt. 3,5 mm.

Hab. in insula Tablas leg. coll. indigena.

Georissa carinulata Q. et Mlldff.

T. ovato-conica, solidula, transverse subtiliter striatula, carinulis 4 bene exsertis cincta, rubella. Anfractus 4 bene convexi, sutura profunda subcanaliculata disjuncti, ultimus basi 2 carinulis cinctus. Apertura acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, columella lata, callosa.

Diam. 1,66, alt. 2 mm.

Hab. in montibus inter Ambabuk et Palanan provinciae Isabela de Luzon.